





Datos orientativos para la programación de cultivos hortícolas

Cabildo de Tenerife, Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural · Oficina de Extensión Agraria Guía de Isora  
Arturo Guanche García

CULTIVO	Semilla Planta	MARCO DE PLANTACIÓN		DENSIDAD plantas/m <sup>2</sup>	PRODUCCIÓN ESTIMADA kg/m <sup>2</sup>	CICLO DE CULTIVO	
		entre líneas	entre plantas			hasta la recolección	duración de recolección
ACELGA	S P	40 - 50	30 - 40	8,3	10-15	55 a 70 días	5 - 7 meses
AJO	P	10 - 20	12 - 15	33-83	0,7-1	120-130	Temporada o estacional
ALCACHOFA	P	80-100	80-100	1	0,5-1,5 hasta 8 frutos/planta	120-150	ver *
APIO	P	30-60	15-30	5,5-22	2-4	110-150	escalonada
ARVEJA	S	60	30	5,5	1-2 (vainas)	50-70	escalonada
BATATA	rama	50-70	50-90	1,6-4	2-3	120-150	escalonada: meses o estacional <sup>2</sup>
BERENJENA	P	40-50	70-100	2-3,5	3-5	90-120	escalonada 6 meses
BERRO	S	10-15	10-15	44-100	2-4 según duración del cultivo	60	escalonada
BETERRADA	P	30	15	22	3-4	60	escalonada 60 días
BRÓCOLI	P	50-60	60-70	2,4-3,3	1,5-2,5	70-90	20 días
CALABAZA	P	2	2	0,25	3-4	120	escalonada conserv. 6 meses
CALABACÍN	P	0,5-1	0,5-1	1-2	3-6	45-60	escalonada
CANÓNIGO	S-P	10	10	100	0,5-0,8	60-80	1 mes
CARDO	P	100	100	1	1,5	120-150	escalonada
CEBOLLA	P	15-20	15	44-33	3	90-120	Temporada o estacional
CEBOLLETA	P	15-20	15	44-33	2	120	30 días
CHALOTTE	P	15	10	66	0,75	120	Temporada o estacional
CHAYOTA	S	400	400	0,06	10-15	4-5 meses	2 veces por semana
COL DE BRUSELAS	P	50	50	4	0,6-1,2	90-120	90
COLIRRABANO	P	35-40	30-40	9,5-6,25	2-4	60-90	20
COL REPOLLO	P	50	50	4	2,5-6	90	20
COL LOMBARDA	P	50	50	4	2,5-6	90	20

# Datos orientativos para la programación de cultivos hortícolas

Cabildo de Tenerife, Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural · Oficina de Extensión Agraria Guía de Isora  
Arturo Guanche García

CULTIVO	Semilla Planta	MARCO de PLANTACIÓN		DENSIDAD plantas/m <sup>2</sup>	PRODUCCIÓN ESTIMADA kg/m <sup>2</sup>	CICLO DE CULTIVO	
		entre líneas	entre plantas			hasta la recolección	duración de recolección
COLIFLOR	P	50-60	60-70	2,4-3,3	1,5-3	90	20
DIENTE DE LEÓN	S-P	20-30	10-15	22-50	2	90	escalonada
ESCAROLA	P	30	30	11	3	80	escalonada
ESPARRAGO	garras	100	50	2	0,5-0,7	2 años	
ESPINACA	P	20-25	10-15	26-50	1,5-2	45-60	30
GARBANZO	S	30-50	10-20	16-25	0,15-0,18	150	estacional
HABA	S	30-40	30	8,3-11	0,8-1	75	escalonada
HABICHUELA BAJA	S	30	30	11	2,5-3	50-60	20
HINOJO DULCE	P	30	20	16	2-4	90-110	30
LECHUGA	P	25-30	25-30	11-16	6-10	45-70	15
MELÓN	P	100	100	1	2,5-3	75-90	15
MILLO	S	50	25	8	1,5-3	60-130	5-20
NABO	P	20-30	15-25	13-33	2-3	60	escalonada
PAPA	S	50	30	7	2-3	90	estacional
PEPINO	P	50-60	50	3,3-4	2-10	60-90	2 meses
PIMIENTO DULCE	P	50	50	2	2,5-4	75	120-180 días
PIMIENTO ITALIANO	P	50	50	2	6-7	75	120-180
PUERRO	P	25-30	10	33-40	2,5-5	90	30
RABANITO	S	10-15	5-10	44	1,5	20-30	10-15
SANDÍA	P	150	100	0,66	2-5	90-120	30
TOMATE	P	60-100	50	2	5-12	75-80	120-180
ZANAHORIA	S	20-25	10-15	50-26	3-6	90-120	30

\* El ritmo de recolección varía a lo largo de la duración de la cosecha, pudiéndose diferenciar varias etapas: en el caso de la alcachofa en la 1ª etapa se recolecta el 25-35% de la producción y en la 2ª entre el 65-75%. En el tomate ver ejemplo, lo mismo sucedería con el pimiento, berenjena, calabacín...







